



Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Ciências da Saúde
Departamento de Parasitologia



PARASITOLOGIA PRÁTICA

Parasitologia

PET

Aluno: _____

Curso: _____

Recife – 2012

PROTOZOÁRIOS




Parasitologia

PET

Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



PET


Parasitologia

Giardíase

A giardíase é o parasita intestinal mais comum em humanos, sendo responsável pelas diarreias em crianças que podem acometer as mesmas acarretando em má nutrição e retardo no desenvolvimento.

Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Parasitologia


PET

Amebíase

Amebíase possui uma distribuição geográfica de amplitude mundial, elevada incidência e acompanha-se em certa proporção dos casos de quadros patológicos graves, constituindo a segunda causa de morte entre as parasitoses.

Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____





Parasitologia

PET

Agente etiológico:_____

Forma evolutiva:_____





Parasitologia


PET

Leishmaniose

A leishmaniose é uma doença crônica, de manifestação cutânea ou visceral, causada por protozoários flagelados do gênero *Leishmania*, da família dos *Trypanosomatidae*. O calazar (leishmaniose visceral) e a úlcera de Bauru (leishmaniose tegumentar americana) são formas da doença.


Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Parasitologia


PET

Tripanossomíase/ Doença de Chagas

A doença de chagas é uma patologia de larga distribuição no continente americano. Doença infecciosa de curso crônico.

Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Parasitologia

PET

Malária

A malária continua sendo um dos principais problemas de saúde apesar de ser antiga e das medidas de controle que vem sendo utilizadas para o seu controle. Estima-se que a doença afeta cerca de 300 milhões de pessoas.


Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Parasitologia

PET



Parasitologia


PET

Teníase/ Cisticercose

A teníase é uma infecção intestinal ocasionada principalmente por dois grandes parasitos hermafroditas da classe dos cestódeos da família Taenidae.

Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Parasitologia

PET

Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Parasitologia

PET

Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____






Parasitologia

PET

Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____





Parasitologia


PET

Tricuríase

É uma infecção que tem distribuição geográfica cosmopolita. Estima-se existirem no mundo cerca de 500 milhões de casos. Prevalência maior em nos lugares de clima quente e úmido e falta de saneamento básico.

Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Parasitologia


PET

Enterobíase

A enterobíase é a verminose intestinal, mais conhecido popularmente como oxiúro. A infecção costuma ser benigna, mas incômoda pelo intenso prurido anal e suas complicações.

Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____




Ascaridíase

Ascaridíase é a mais cosmopolita e mais frequente helmintíase, na maioria das vezes a infecção é leve e benigna .As crianças são as mais pesadamente atingidas sendo deste modo assunto de interesse pediátrico e social.


Agente etiológico:_____

Forma evolutiva:_____



Agente etiológico:_____

Forma evolutiva:_____



Parasitologia


PET

Ancilostomiase

As ancilostomoses humanas são ocasionadas por duas espécies de ancilostomídeos. Foi estimado que cerca de 900 milhões de pessoas são parasitadas e cerca de 60 mil pessoas morrem.

Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____





Parasitologia

PET

Agente etiológico:_____

Forma evolutiva:_____





Parasitologia


PET

Esquistossomose

A esquistossomose também conhecida como barriga d'água, mal do caramujo. É endêmica em uma vasta área localizada principalmente na região nordeste e em Minas Gerais. Estima-se que o Brasil tenha de 6 a 8 milhões de portadores sendo Pernambuco com uma alta taxa de prevalência.


Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Parasitologia

PET

Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____



PET

Parasitologia

Filariose

A filariose apresenta vasta distribuição geográfica, endêmica em várias regiões de muita pobreza e com clima tropical e subtropical. Conhecida popularmente como elefantíase.

Agente etiológico: _____

Forma evolutiva: _____





Parasitologia

PET